

Danube Mathematical Competition

Călărași – 31. 10. 2015

Soluții juniori

Problema 1

Se consideră un număr natural $n = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}$, $k \geq 2$. Un *trunchiat* al lui n este un număr de forma $\overline{a_1 a_2 \dots a_t}$, $1 \leq t \leq k-1$. (De exemplu, numărul 23 este un trunchiat al numărului 2351). Se notează cu $T(n)$ suma tuturor trunchiaților lui n . Dacă $S(n) = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, arătați că $n = S(n) + 9 \cdot T(n)$.

TST – Olanda 2009. Selectată de prof. Andrei Eckstein, Timișoara

Soluție: $T(n) = \sum_{t=1}^{k-1} \overline{a_1 a_2 \dots a_t}$. Pentru $t \geq 2$ avem $\overline{a_1 a_2 \dots a_t} = a_t + 10 \cdot \overline{a_1 a_2 \dots a_{t-1}}$.

Adunând relațiile obținute se obține concluzia.

Problema 2

Se consideră mulțimea $A = \{1, 2, 3, \dots, 120\}$ și M o submulțime a lui A care are 30 de elemente. Arătați că există cinci submulțimi diferite ale lui M , fiecare având câte două elemente, astfel încât modulul diferenței elementelor din fiecare submulțime să fie același.

Selectată de prof. Cristian Mangra, București

Soluție. Fie $M = \{a_1, a_2, \dots, a_{30}\}$, unde $a_1 < a_2 < \dots < a_{30}$. Presupunem contrariul și considerăm submulțimile $M_1 = \{a_1, a_2\}$, $M_2 = \{a_2, a_3\}$, ..., $M_{29} = \{a_{29}, a_{30}\}$. Atunci:

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{29} - a_{28}) + (a_{30} - a_{29}) \geq 4 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) + 8 = 120.$$

Obținem $a_{30} - a_1 \geq 120$, de unde $a_{30} > 120$, contradicție.

Problema 3

Rezolvați în mulțimea numerelor naturale ecuația $a^2 = 2^b \cdot 3^c + 1$.

prof. Lucian Petrescu, Tulcea

Soluție. Dacă $b = 0$, ecuația se scrie $3^c = (a-1)(a+1)$. Rezultă că a este par și atunci $(a-1, a+1) = 1$; se obține soluția $(a, b, c) = (2, 0, 1)$.

Dacă $b \geq 1$, atunci a este impar, deci $(a-1, a+1) = 2$. Cum $2^b \cdot 3^c = (a-1)(a+1)$, sunt trei posibilități:

Cazul 1: $\begin{cases} a-1=2 \\ a+1=2^{b-1} \cdot 3^c \end{cases}$, care conduce la soluția $(a, b, c) = (3, 3, 0)$.

Cazul 2: $\begin{cases} a-1=2^{b-1} \\ a+1=2 \cdot 3^c \end{cases}$, care conduce la $3^c - 2^{b-2} = 1$.

Pentru $b \leq 2$ nu avem soluție. Pentru $b = 3$ obținem $(a, b, c) = (5, 3, 1)$. Dacă $b \geq 4$, analizând ecuația modulo 4, obținem că c este număr par nenul. Notând $c = 2k$, $k \geq 1$, atunci $2^{b-2} = (3^k - 1)(3^k + 1)$. Cum $(3^k - 1, 3^k + 1) = 2$, deducem că $3^k - 1 = 2$, deci $k = 1$. Obținem soluția $(a, b, c) = (17, 5, 2)$.

Cazul 3: $\begin{cases} a-1=2 \cdot 3^c \\ a+1=2^{b-1} \end{cases}$, cu $c \geq 1$ (pentru $c = 0$ suntem în cazul 1), care conduce la $2^{b-2} - 3^c = 1$.


Reducând modulo 3, rezultă că b este par, $b = 2p$, $p \geq 2$, de unde se obține $(2^{p-1} - 1)(2^{p-1} + 1) = 3^c$. Ca urmare, există $m, n \in \mathbb{N}$ astfel încât $2^{p-1} - 1 = 3^m$ și $2^{p-1} + 1 = 3^n$, de unde $3^n - 3^m = 2$, echivalent cu $3^m(3^{n-m} - 1) = 2$. Se obține $m = 0$, $n = 1$, $p = 2$, valori care conduc la soluția $(a, b, c) = (7, 4, 1)$.

Așadar, ecuația are cinci soluții: $(2, 0, 1)$, $(3, 3, 0)$, $(5, 3, 1)$, $(7, 4, 1)$ și $(17, 5, 2)$.

Problema 4

Se consideră dreptunghiul $ABCD$, cu $AB \geq BC$. Punctul M este situat pe latura (AD) , iar mediatoarea segmentului $[MC]$ intersectează dreapta BC în punctul N . Fie $\{Q\} = MN \cap AB$. Știind că $m(\sphericalangle MQA) = 2 \cdot m(\sphericalangle BCQ)$, arătați că patrulaterul $ABCD$ este pătrat.

Selectată de prof. Mircea Fianu, București



Soluție. Bisectoarea unghiului \widehat{NQB} intersectează dreapta BC în punctul P . Deoarece $\widehat{NQB} \equiv \widehat{MQA}$, rezultă că $\widehat{PQB} \equiv \widehat{QCP}$. Deducem că triunghiul PQC este dreptunghic în Q . Prin urmare, semidreapta $(QC$ este bisectoarea unghiului \widehat{MQB} .

Considerăm $R \in MN$ astfel încât $CR \perp MN$. Cum $CB \perp QB$, rezultă că $CB = CR$. (1)

Fie $S \in BC$ astfel încât $MS \perp BC$. Cum triunghiul NMC este isoscel, $NC = NM$, rezultă că $CR = MS$ (înălțimi). (2)

Deoarece patrulaterul $ABSM$ este dreptunghi obținem $AB = MS$. (3)

Din (1), (2), (3), deducem că $AB = BC$, deci patrulaterul $ABCD$ este pătrat.

Problema 5

Pentru a funcționa, o lanternă are nevoie de **exact două** baterii încărcate. Avem la dispoziție n baterii încărcate și n baterii descărcate, $n \geq 4$. (Cele $2n$ baterii arată identic.)

O probă înseamnă constă în a introduce două baterii în lanternă și a verifica dacă lanternă funcționează. Arătați că sunt suficiente $n + 2$ probe pentru a determina o pereche de baterii încărcate.

Selectată de prof. Cristian Lazăr, Iași

Soluție. Folosind principiul cutiei, are loc următoarea:

Observație. Având a baterii încărcate și b baterii descărcate, cu $a - b \geq 2$ și $b \geq 2$, sunt suficiente b probe pentru a determina o pereche de baterii încărcate.

Prin urmare, în cazul nostru, este suficient ca, printr-un număr mic de probe, să eliminăm un număr de baterii neîncărcate cu cel puțin 2 mai mare decât numărul de baterii încărcate.

Dacă inițial alegem la întâmplare două seturi de câte 3 baterii, pentru fiecare set în parte sunt necesare cel mult 3 probe, în total cel mult 6 probe. Dacă lanternă nu se aprinde, înseamnă că în fiecare set de baterii, cel mult una este încărcată și cel puțin 2 sunt descărcate. Eliminând cele 6 baterii din cele $2n$ baterii, rămânem cu cel puțin $n - 2$ baterii încărcate și cel mult $n - 4$ baterii descărcate. Conform observației, sunt suficiente $n - 4$ probe pentru a determina o pereche de baterii încărcate. În acest caz, am efectuat cel mult $6 + (n - 4) = n + 2$ probe.